

## **Пам'ятка пацієнту після атипового видалення зуба**

Антибіотик - Аугментин (875) - 1 пігулку 2 рази на день (7 днів);

Десенсибілізуючий засіб –цитрин, діазолін, супрастин, лоратадін - 1 пігулку 1 раз на день (7 днів);

Протизапальний засіб – Німесил (Афіда) - 1 пакетик 2 рази на день ( 5 днів);

Знеболювальний засіб – Дексалгін (Кейвер) – приймати при сильних болях;

Пробіотик -1 уп.

Дентальна адгезивна паста - Солкосерил - наносити на ясна 2 рази на день після їжі ( 14 днів);

### **Огляд на третій та чотирнадцятий день!**

1) Тампон тримати 20 хвилин у ротовій порожнині;

Після операції кров'яні виділення з рани можуть бути протягом 2х годин. Не випльовувати кров і слину в перший день після операції та вдома до щоки прикласти холодний компрес на 10-15 хв, міняти його в міру потреби (холод допоможе знизити ризик виникнення сильного набряку на обличчі, але не прибере цей ризик повністю). Набряк може збільшуватись протягом 2-3 днів після операції, далі йде на спад.

2) Уникати паління мінімум 24 години після операції (при палінні розширюються капіляри слизової оболонки), що перешкоджає одужанню;

3) Уникати відвідування лазні та гарячої ванни перші два післяопераційних дні, фізичного навантаження та гарячої їжі;

4) Вживати в перший день після операції енергетично збагачену їжу.

5) Чистити зуби обережно, м'якою зубною щіткою. При болях протягом перших 2х післяопераційних днів користуйтеся знеболюючими ліками, які порадив лікар.

**P.S** Звернутися до лікаря, якщо піднімається і тримається температура, якщо набряк збільшується на 3-4 день після операції, в ротовій порожнині з'явився неприємний присмак гною. Ознаки запалення: температура, набряклість, постійний біль, почервоніння слизової оболонки, утруднене відкривання рота. Зазвичай ознаки запалення з'являються на 3 день після операції.

Бажаємо Вам успіхів.

